ワクチン		種類	乳児期										幼児期							学童期／思春期				
			生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ）		不活化			①	②	③						④（注１）											
肺炎球菌（PCV13)		不活化			①	②	③						④							(注2)				
B型肝炎	ユニバーサル	不活化			①	②				③			（注３）											
	母子感染予防		①	②					③															
ロタウイルス	１価	生			①	②	(注４)																	
	５価				①	②	③	(注５)																
４種混合（DPT-IPV）		不活化			①	②	③						④（注６）			(7.5歳まで)								
３種混合（DPT）		不活化			①	②	③						④（注６）			(7.5歳まで)								
																			⑤（注７）				⑥11-12歳（注８）	
２種混合（DT）		不活化																					11歳①	12歳

ポリオ（IPV）		不活化			①	②	③						④（注６）			(7.5歳まで)								
																			⑤（注９）					
BCG		生						①																
麻疹・風疹混合（MR）		生											①						②（注 10）				
水痘		生											①		②					(注 11)				
おたふくかぜ		生											①						②（注 12）				
日本脳炎		不活化															①②	③	(7.5歳まで)			④9-12歳		
インフルエンザ		不活化																						
													毎年（10、11月などに）①②										13歳より①	
ヒトパピローマウイルス（HPV）	2価,4価	不活化																						
																						(注 13)	小6	中１①②③（注14）	中２～高１	(注15)
	9価	不活化																				(注 13)	小6	中１①②（注14）	中２～高１	(注15)